

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Воронежский государственный технический университет»

Строительно-политехнический колледж

## **РЕШЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ**

### ***МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ***

*к выполнению самостоятельных работ  
по математике для студентов 1-го курса*

Воронеж 2020

**УДК 51(075.7)**  
**ББК 22.1я7**

*Составители: З. И. Шахбазова, С. Л. Рыбина, Н. В. Федотова,  
И. И. Корчагин*

**Решение логарифмических уравнений:** методические указания к выполнению самостоятельных работ по математике для студентов 1 курса/ ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; сост.: З. И. Шахбазова, С. Л. Рыбина, Н. В. Федотова, И. И. Корчагин. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2020. 17 с.

Даны теоретические сведения по решению логарифмических уравнений, приведены примеры решения уравнений, даны задания для самостоятельной работы. Могут использоваться для подготовки индивидуальных проектов и для подготовки к сдаче ЕГЭ.

Предназначены для самостоятельной работы по дисциплине «Математика» для студентов 1 курса.

Методические указания подготовлены в электронном виде и содержатся в файле МУ ЛРУ pdf.

**УДК 51(075.7)**  
**ББК 22.1я7**

*Рецензент – М. Ю. Глазкова, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры  
технологии строительных материалов, изделий  
и конструкций ВГТУ*

*Издается по решению редакционно-издательского совета  
Воронежского государственного технического университета*

## ВВЕДЕНИЕ

Данные методические указания предназначены для студентов 1 курса Строительно-политехнического колледжа (далее - СПК) всех специальностей в освоении методов решения логарифмических уравнений.

Сообщаются основные определения, формулы, методы решения логарифмических уравнений. Приводятся примеры решения логарифмических уравнений.

Методические указания содержат задания для самостоятельного решения.

### Общие положения

**Самостоятельная работа студентов** – это работа, которая выполняется ими по заданию преподавателя, без его непосредственного участия (но под его руководством) в специально представленное для этого время.

#### Цели и задачи самостоятельной работы:

- систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и навыков студентов;
- углубления и расширения теоретических и практических знаний;
- формирования умений использовать специальную, справочную литературу, Интернет;
- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских знаний.
- обеспечение базы знаний для профессиональной подготовки выпускника в соответствии с ФГОС СПО;
- формирование и развитие общих компетенций, определённых в ФГОС СПО;
- подготовка к формированию и развитию профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности.
- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления: способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- овладение практическими навыками применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- развитие исследовательских умений.

**Критериями оценки результатов** внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при решении уравнений;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

## 1. Общие сведения о логарифмических уравнениях

Логарифмическими уравнениями называются уравнения, содержащие неизвестное только под знаком логарифма или в основании логарифма.

Например:  $\log_2 x = 3$ ;  $\log_2^2 x - 5\log_2 x + 6 = 0$ ;  $\log_{x-3} 4 = 2$

Уравнения вида  $\log_a x = b$  (1) и  $\log_x m = n$  (2),

где  $x$  – неизвестное, а  $a, b, m, n$  – заданные числа, являются простейшими логарифмическими уравнениями.

Если  $x > 0, a > 0$  и  $a \neq 1$ , то уравнение (1) при любом действительном значении  $x$  имеет единственное решение  $x = a^b$ .

Если  $m > 0, x > 0$  и  $x \neq 1$ , то уравнение (2) имеет единственное решение  $x = \sqrt[n]{m}$ .

Логарифмические уравнения, как и показательные, рассматриваются только на множестве действительных чисел.

**ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ**, применяемые при решении логарифмических уравнений.

( $a > 0, b > 0, c > 0, c \neq 1$ )

1.  $\log_c ab = \log_c a + \log_c b$

2.  $\log_c \frac{a}{b} = \log_c a - \log_c b$

3.  $\log_c a^n = n \log_c a$

4.  $\log_c \sqrt[n]{a} = \frac{1}{n} \log_c a$

5.  $a^{\log_a N} = N$  – основное логарифмическое тождество.

6.  $\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$  – формула перехода от одного основания логарифмов к другому.

7.  $\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$

8.  $\log_b n a = \frac{1}{n \log_a b}$

9.  $\log_b a = \log_{b^n} a^n = \log_{\sqrt[n]{b}} \sqrt[n]{a}$

Преобразования, которые применяются при решении логарифмических и показательных уравнений.

### 1. Потенцирование.

$\log_{\varphi(x)} f(x) = \log_{\varphi(x)} q(x)$  (1) Могут появиться посторонние корни!

$f(x) = q(x)$  (2) Необходима проверка!

## 2. Логарифмирование.

$$f(x) = q(x)(1)$$

Могут быть потеряны корни!

$$\log_a f(x) = \log_a q(x)(2)$$

Но если  $a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, q(x) > 0$ , то (2) равносильно (1). В этом случае логарифмирование допустимо.

## 3. Применение свойств логарифмов.

Возможно появление посторонних корней. Необходима проверка!

## 2. Уравнения, решаемые по определению логарифма

Решение сложных логарифмических уравнений сводится в большинстве случаев к решению простейших логарифмических уравнений.

Уравнение  $\log_a f(x) = b, f(x) > 0$  равносильно уравнению  $f(x) = a^b$  (1)

Уравнение  $\log_x f(a) = b, f(a) > 0, x > 0, x \neq 1$  равносильно уравнению  $f(a) = x^b, x = \sqrt[b]{f(a)}$  (2)

Рассмотрим решение простейших логарифмических уравнений.

1. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\log_3(1 - 2x) = 1$

Область определения уравнения:  $1 - 2x > 0; -2x > -1; x < \frac{1}{2}$

На основании определения логарифма можно записать

$$1 - 2x = 3$$

$$-2x = 2$$

$$x = -1 \quad -1 < \frac{1}{2}$$

Проверка:  $\log_3(1 - 2 \cdot (-1)) = \log_3 3 = 1; 1 = 1$ .

Ответ: -1.

2. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\log_x \sqrt[5]{36^{-1}} = -0,4$

Область определения уравнения:  $x > 0; x \neq 1$

На основании определения логарифма можно записать

$$x^{-0,4} = 36^{-\frac{1}{5}}$$

$$x^{-0,4} = 6^{-\frac{2}{5}} = 6^{-0,4}$$

$$x = 6$$

В этом и последующих примерах проверку делайте самостоятельно!

Ответ: 6.

3. ВЫЧИСЛИТЬ  $x$ :  $\log_{0,32} \frac{2\sqrt{2}}{5} = x$

Данное уравнение равносильно уравнению:

$$(0,32)^x = \frac{2\sqrt{2}}{5}$$

Преобразуем это уравнение:

$$\left(\frac{8}{25}\right)^x = \frac{2\sqrt{2}}{5}$$

$$\left(\frac{\sqrt{8}}{5}\right)^{2x} = \frac{\sqrt{8}}{5}$$

$$2x = 1$$

$$x = \frac{1}{2}$$

Ответ:  $\frac{1}{2}$ .

4. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\lg(81 \cdot \sqrt[3]{3^{x^2-8x}}) = 0, x \in \mathbb{R}$

Данное уравнение равносильно уравнению:

$$81 \cdot \sqrt[3]{3^{x^2-8x}} = 10^0 = 1$$

$$3^4 \cdot 3^{\frac{x^2-8x}{3}} = 3^0$$

$$3^{4+\frac{x^2-8x}{3}} = 3^0$$

$$4 + \frac{x^2 - 8x}{3} = 0$$

$$x^2 - 8x + 12 = 0; x_1 = 2, x_2 = 6$$

Проверка:

$$1) \lg(81 \cdot \sqrt[3]{3^{2^2-8 \cdot 2}}) = \lg(81 \cdot 3^{-\frac{12}{3}}) = \lg(3^4 \cdot 3^{-4}) = \lg 1 = 0$$

$$2) \lg(81 \cdot \sqrt[3]{3^{6^2-8 \cdot 6}}) = \lg(81 \cdot 3^{-\frac{12}{3}}) = \lg(3^4 \cdot 3^{-4}) = \lg 1 = 0$$

Ответ: 2;6.

5. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\log_2(3\log_3(\log_2 x)) = 0$

Область определения уравнения:  $3\log_3(\log_2 x) > 0,$

$\log_3(\log_2 x) > 0, \log_2 x > 1, x > 2$

Из определения логарифма следует:

$$3\log_3(\log_2 x) = 2^0 = 1$$

$$\log_3(\log_2 x) = \frac{1}{3}$$

Решив уравнение, получим:

$$\log_2 x = 3^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{3}; x = 2^{\sqrt[3]{3}}$$

Так как  $\sqrt[3]{3} > 1, 2^{\sqrt[3]{3}} > 2$ , а, следовательно, полученный корень принадлежит области определения уравнения.

Ответ:  $2^{\sqrt[3]{3}}$ .

6. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\log_{x-1}(3x-1) = 3.$

Область определения уравнения:

$$\begin{cases} x-1 > 0 \\ x-1 \neq 1 \\ 3x-1 > 0 \end{cases} \begin{cases} x > 1 \\ x \neq 2 \\ x > \frac{1}{3} \end{cases} \quad x > 1, x \neq 2; (1, 2) \cup (2, +\infty)$$

Из определения логарифма следует:

$$3x - 1 = (x - 1)^3$$

Решаем это уравнение:

$$3x - 1 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

$$x^3 - 3x^2 = 0$$

$$x^2(x - 3) = 0; x_{1,2} = 0, x_3 = 3$$

$x_{1,2} = 0$  не входят в область определения уравнения, их надо отбросить.

Убедитесь, что  $x = 3$  является корнем уравнения.

Ответ: 3.

### Задания для самостоятельного решения.

#### Решить уравнения

1.  $\log_2(9 - 2^x) = 3 - x$  3;0

2.  $\lg(10^x + 10^{2x} - 10^{1-2x} + 9) = x$  0

3.  $\log_5 \log_3(x^2 - 9x + 23) = 0$  4;5

4.  $\lg \sqrt{75 + 5^{\sqrt[3]{x-1}}} = 1$

5.  $\log_x(2x^{x-2} - 1) = 2x - 4$

6.  $\log_x(8 \cdot \sqrt[5]{0,25}) = \frac{13}{5}$

7.  $\log_\pi \log_3 \log_2 \log_2 x = 0$

8.  $2 \log_{\log_2 x}^2 = 1$

9.  $\lg(36 + 2^{2(x-1)})^{\frac{3}{2}} = 3$

10.  $\log_5 \log_{10} \sqrt{x^2 + 19} = 0$

11.  $\log_7 \log_4 \log_3^2(x - 7) = 0$

### 3. Уравнения, решаемые потенцированием

Логарифмические уравнения  $\log_a f_1(x) = \log_a f_2(x)$  (1), где  $a > 0, a \neq 1$ , после потенцирования приводятся к виду  $f_1(x) = f_2(x)$ . Потенцирование может привести к появлению посторонних корней. Источник появления посторонних корней – применение формулы логарифма произведения.

В этом случае проверка обязательна, она является составной частью решения.

1. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\log_2(3 - x) + \log_2(1 - x) = 3$

Область определения уравнения:

$$\begin{cases} 3 - x > 0 \\ 1 - x > 0 \end{cases} \begin{cases} x < 3 \\ x < 1 \end{cases} x < 1$$

На основании формулы  $\log_c ab = \log_c a + \log_c b$  имеем:

$$\log_2(3 - x) \cdot (1 - x) = 3$$

По определению логарифма будем иметь:

$$(3 - x) \cdot (1 - x) = 8$$

$$x^2 - 4x - 5 = 0$$

$$x_1 = 5, x_2 = -1$$

Первое значение неизвестного не принадлежит области определения, его отбрасываем.

Проверкой убедитесь, что  $x = -1$  является корнем уравнения.

Ответ: -1.

2. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $2 \lg(2x + 3) = 1 + \lg(x + 0,9)$

Область определения уравнения:

$$\begin{cases} x > -\frac{3}{2} \\ x > -0,9 \end{cases}$$

Преобразуем уравнение:

$$\lg(2x + 3)^2 = \lg 10 + \lg(x + 0,9)$$

$$\lg(2x + 3)^2 = \lg(10 \cdot (x + 0,9))$$

Пропотенцировав, получим:

$$(2x + 3)^2 = 10(x + 0,9)$$

$$4x^2 + 12x + 9 = 10x + 9$$

$$4x^2 + 2x = 0$$

$$2x(2x + 1) = 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = -0,5$$

Оба корня входят в область определения.

Ответ: -0,5;0.

3. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\lg(2^x + x - 41) = x(1 - \lg 5)$

Область определения уравнения:  $2^x + x - 41 > 0$

Преобразуем правую часть:

$$x(1 - \lg 5) = x(\lg 10 - \lg 5) = x \lg \frac{10}{5} = x \lg 2 = \lg 2^x$$

После преобразования получим уравнение:

$$\lg(2^x + x - 41) = \lg 2^x$$

Пропотенцировав, будем иметь:  $2^x + x - 41 = 2^x$ ,  $x = 41$

Проверка – непосредственной подстановкой, так как нахождение области определения сложно.

$$\lg(2^{41} + 41 - 41) = 41(1 - \lg 5)$$

$$\lg 2^{41} = 41(1 - \lg 5) = 41(\lg 10 - \lg 5) = 41 \lg 2 = \lg 2^{41}; 2^{41} = 2^{41}$$

Ответ: 41.

4. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\log_2(9^{x-1} + 7) = 2 + \log_2(3^{x-1} + 1)$ .

Область определения уравнения:  $x \in \mathbb{R}$ .

Перепишем данное уравнение:

$$\log_2(9^{x-1} + 7) = \log_2 4 + \log_2(3^{x-1} + 1)$$

$$\log_2(9^{x-1} + 7) = \log_2(4 \cdot (3^{x-1} + 1))$$

Пропотенцировав, получим:

$$3^{2(x-1)} + 7 = 4 \cdot (3^{x-1} + 1)$$

$$3^{2(x-1)} - 4 \cdot 3^{x-1} + 3 = 0$$

Решив полученное показательное уравнение, находим:

$$1) 3^{x-1} = 1, x_1 = 1; 2) 3^{x-1} = 3, x_2 = 2. \text{ Ответ: } 1; 2.$$

5. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\frac{\lg(\sqrt{x+1}+1)}{\lg \sqrt[3]{x-40}} = 3$ .

Область определения уравнения:  $(40, +\infty)$ ;  $x \neq 41$

Освободимся от знаменателя дроби:

$$\lg(\sqrt{x+1}+1) = 3 \lg \sqrt[3]{x-40} = \lg(x-40)$$

Пропотенцировав, получим:

$$\sqrt{x+1}+1 = x-40$$

$$\sqrt{x+1} = x-41$$

Пусть  $\sqrt{x+1} = y$ , тогда  $x+1 = y^2$ ,  $x = y^2 - 1$ .



Уравнение имеет вид:  $y^2 - y - 42 = 0$

Решив уравнение, будем иметь:  $y_1 = -6$ ;  $y_2 = 7$ .

а)  $\sqrt{x+1} = -6$  – уравнение не имеет корней.

б)  $\sqrt{x+1} = 7$ ,  $x+1 = 49$ ,  $x = 48$ .

Проверка подтверждает, что  $x = 48$  – корень.

Ответ: 48.

### Задания для самостоятельного решения.

#### Решить уравнения

1.  $2\lg x = -\lg(6 - x^2)\sqrt{2} \pm 1$

2.  $0,5 \lg(2x - 1) + \lg\sqrt{x - 9} = 1$

3.  $\frac{\log_3(x-4)-1}{\log_3(x-2)} + 1 = 0$

4.  $\lg 9^{-1} + \frac{1}{3} \lg 3^{x(5x-7)} = 0 - 0,6; 2$

5.  $\lg(5^{2x} + 4x - 16) = \lg 10^{2x} - \lg 4^x$

6.  $5 \log_2 3 + 2 \log_2 \sqrt{(x-2)\sqrt{8}} - \frac{5}{3} \log_2 27 = 1,5$

7.  $\lg\sqrt{x-5} + \lg\sqrt{2x-3} + 1 = \lg 30$

8.  $\lg\left(x - \frac{8}{9}\right) = 2\lg\frac{1}{6}\frac{11}{12}$

9.  $\lg 10 + \frac{1}{3} \lg(271 + 3\sqrt{2x}) = 2$

10.  $\log_2(\lg x + 2\sqrt{\lg x + 1}) - 2 \log_4(\sqrt{\lg x + 1}) = 1$

### 4. Уравнения, сводящиеся к алгебраическим уравнениям

В некоторых случаях с помощью подстановки (замены переменной)  $y = \log_a x$  или  $y = \log_x a$  [ $y = \log_a u$  или  $y = \log_u a$ , где  $u = u(x)$ ] логарифмическое уравнение сводится к алгебраическому.

1. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\log_2^3 x + 3 = 2 \log_2 x^2$ .

Область определения:  $x > 0$

Преобразуем уравнение к виду  $\log_2^3 x - 4 \log_2 x + 3 = 0$

Замена  $\log_2 x = u$  уприводит уравнение к квадратному уравнению.

$y^2 - 4y + 3 = 0$ ,  $y_1 = 1$ ;  $y_2 = 3$ , т.е.  $\log_2 x = 3$ ,  $x_1 = 8$ ;  $\log_2 x = 1$ ,  $x_2 = 2$ .

Проверка:

$\log_2^3 8 + 3 = 2 \log_2 8^2$ ,  $12 = 12$ ;

$\log_2^3 2 + 3 = 2 \log_2 2^2$ ,  $4 = 4$ .

Ответ: 2; 8.

2. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\frac{\lg(6-x)}{2} = \frac{1}{3 \lg(6-x)-1}$ .

Область определения:  $x \in (-\infty; 6 - \sqrt[3]{10}) \cup (6 - \sqrt[3]{10}; 6)$

Преобразуем уравнение к виду:  $3\lg^2(6-x) - \lg(6-x) - 2 = 0$

Введем замену:  $\lg(6-x) = y$ , получим  $3y^2 - y - 2 = 0$

Решив уравнение, будем иметь:  $y_1 = -\frac{2}{3}$ ;  $y_2 = 1$ .

$$\lg(6-x) = -\frac{2}{3}, 6-x = 10^{-\frac{2}{3}}, x_1 = 6 - \sqrt[3]{0,01};$$

$$\lg(6-x) = 1, 6-x = 10, x_2 = -4.$$

Оба значения входят в область определения. Проверкой можно убедиться, что оба значения являются корнями данного уравнения.

Ответ:  $6 - \sqrt[3]{0,01}; -4$ .

3. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\frac{1}{5-\lg x} + \frac{2}{1+\lg x} = 1$ .

Область определения:  $\begin{cases} x > 0; \\ 5 - \lg x \neq 0; \\ 1 + \lg x \neq 0. \end{cases} \begin{cases} x > 0; \\ \lg x \neq 5; \\ \lg x \neq -1. \end{cases} \begin{cases} x > 0; \\ x \neq 10^5; \\ x \neq 0,1. \end{cases}$

$$x \in (0; 0,01) \cup (0,1; 10^5) \cup (10^5; +\infty).$$

Введем подстановку  $\lg x = y$ , тогда относительно  $y$  уравнение имеет вид:

$$\frac{1}{5-y} + \frac{2}{1+y} = 1$$

Решим полученное уравнение:

$$1+y+(5-y)2=(5-y)(1+y)$$

$$y^2-5y+6=0, y_1=2; y_2=3.$$

Тогда получим:

$$\lg x = 2; x_1 = 100;$$

$$\lg x = 3; x_2 = 1000.$$

Ответ: 100; 1000.

4. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\lg 10x \lg 0,1x = \lg x^3 - 3$ .

Область определения:  $x > 0$

Преобразуем уравнение к виду:

$$(1+\lg x)(-1+\lg x) = 3\lg x - 3$$

$$\lg^2 x - 3\lg x + 2 = 0.$$

Введем замену:  $\lg x = y$  и получим:

$$y^2 - 3y + 2 = 0, y_1 = 1; y_2 = 2$$

$$\lg x = 1, x_1 = 10; \lg x = 2, x_2 = 100.$$

Ответ: 10; 100.

**Задания для самостоятельного решения и самоконтроля.**

**Решить уравнения**

1.  $\log_2^2 x - 5\log_2 x + 6 = 0$

2.  $\lg^2 100x + 2\lg x = 20$

3.  $\lg^2 x - \lg x^2 = \lg^2 3 - 1$

4.  $2 - \frac{1}{2-\log_2 x} = \frac{3}{4-\log_2 x}$

5.  $\sqrt{\lg x} + \sqrt[4]{\lg x} = \frac{3}{4} 10^{\frac{1}{16}}$

6.  $\lg x^4 - \frac{30}{\lg x} = 210^{-\frac{5}{2}}; 1000$

7.  $3\lg^2(x-1) - 10\lg(x-1) + 3 = 01 + \sqrt[3]{10}; 1001$

8.  $\lg^2 x - \lg x^3 + 2 = 0$

9.  $\frac{1}{\lg^2 x} + \frac{\lg^2 x}{100} = 0,29$

## 5. Уравнения, решаемые посредством логарифмирования

Способ логарифмирования применяется для решения показательно-логарифмических уравнений.

Уравнения, содержащие неизвестное в показателе степени  $x$  под знаком логарифма, называется показательно-логарифмическим.

Логарифмируя обе части уравнения, приводят их к логарифмическим.

Замечание. Уравнения  $f_1(x) = f_2(x)$  и  $\log_a f_1(x) = \log_a f_2(x)$  неравносильны, при логарифмировании сужается область определения уравнения (на 2-ое уравнение накладывается ограничительные условия:  $f_1(x) > 0$  и  $f_2(x) > 0$ , следовательно, возможна потеря корней).

Если  $f_1(x) > 0, f_2(x) > 0, a > 0, a \neq 1$ , то оба уравнения равносильны, логарифмирование допустимо.

1. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $5^{3 \lg x} = 12,5x$ .

Область определения:  $x > 0$ .

Логарифмируем по основанию 10:

$$3 \lg x \lg 5 = \lg 12,5 + \lg x.$$

Решим уравнение относительно  $\lg x$ :

$$(3 \lg 5 - 1) \lg x = \lg 12,5;$$

$$\lg x = \frac{\lg 12,5}{3 \lg 5 - 1} = \frac{\lg 12,5}{\lg 125 - \lg 10} = \frac{\lg 12,5}{\lg 12,5} = 1, \text{ тогда } x = 10.$$

Ответ: 10.

2. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $x^{\frac{\lg x + 7}{4}} = 10^{\lg x + 1}$ .

Область определения:  $x > 0$

Прологарифмируем по основанию 10:

$$\frac{\lg x + 7}{4} \lg x = (\lg x + 1) \lg 10$$

$$\lg^2 \frac{x}{4} + \frac{7}{4} \lg x = \lg x + 1$$

$$\lg^2 x + 7 \lg x - 4 \lg x - 4 = 0$$

После упрощения получаем уравнение:

$$\lg^2 x + 3 \lg x - 4 = 0.$$

Решаем его как квадратное уравнение относительно  $\lg x$ .

$$\lg x = -4; \lg x = 1$$

$$x_1 = 10^{-4} = 0,0001; x_2 = 10.$$

Ответ: 0,0001; 10.

3. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $x^{\log_2 x^3 - \log_2^2 x - 3} = \frac{1}{x}$ .

Область определения:  $x > 0$

Прологарифмируем по основанию 2 и упростим уравнение:

$$(\log_2 x^3 - \log_2^2 x - 3) \log_2 x = -\log_2 x$$

$$3\log_2^2 x - \log_2^3 x - 3\log_2 x + \log_2 x = 0$$

$$\log_2^3 x - 3\log_2^2 x + 2\log_2 x = 0$$

Вынесем общий множитель за скобки и решим уравнение:

$$\log_2 x (\log_2^2 x - 3\log_2 x + 2) = 0$$

$$\log_2 x = 0, x_1 = 1$$

$$\log_2 x = 1, x_2 = 2$$

$$\log_2 x = 2, x_3 = 4$$

Ответ: 1; 2; 4.

### Задания для самостоятельного решения

#### Решить уравнения

1.  $x^{\lg^3 x - 5 \lg x} = 0,0001$

2.  $x^{\log_2 x} = 4x$

3.  $x^{\log_2 x + 2} = 8\frac{1}{8}; 2$

4.  $x^{2\lg^2 x} = 10x^3 \frac{1}{10}; 10^{\frac{1+\sqrt{3}}{2}}$

5.  $x^{\log_3 x - 4} = \frac{1}{27}$

6.  $x^{1 - \lg x} = 0,01$

7.  $x^{\frac{1}{4}(\lg x + 7)} = 10^{\lg x + 1}$

8.  $x^{\lg^3 x - 5 \lg x} = 0,0001$

9.  $x^{2\lg^3 x - \frac{3}{2}\lg x} =$

10.  $x^{\lg x - 3} = 10^{\lg \frac{10}{x} - 1}$

### 6. Уравнения, в которых используется модуль перехода и различные логарифмические тождества

1. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\log_x 7 + \log_{x^2} 7 = 6$ .

Область определения:  $x > 0, x \neq 1$

Перейдем к основанию  $x$ , используя формулу  $\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$ ,

$$\log_x 7 + \frac{\log_x 7}{\log_x x^2} = 6$$

$$\log_x 7 + \frac{\log_x 7}{2} = 6$$

$$3\log_x 7 = 12, \log_x 7 = 4, x^4 = 7, x = \sqrt[4]{7}. \quad \text{Ответ: } \sqrt[4]{7}.$$

2. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\log_x 10 + 2 \log_{10x} 10 + 3 \log_{100x} 10 = 0$ .

Область определения:  $x > 0, x \neq 1, x \neq \frac{1}{10}, x \neq \frac{1}{100}$

Используя тождество  $\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$ , получим:

$$\frac{1}{\lg x} + \frac{2}{\lg 10x} + \frac{3}{\lg 100x} = 0$$

$$\frac{1}{\lg x} + \frac{2}{1 + \lg x} + \frac{3}{2 + \lg x} = 0, \quad 3 \lg^2 x + 5 \lg x + 1 = 0$$

Решив относительно  $\lg x$  уравнение, получим:  $\lg x = \frac{-5 \pm \sqrt{13}}{6}, x = 10^{\frac{-5 \pm \sqrt{13}}{6}}$ .

Ответ:  $10^{\frac{-5 \pm \sqrt{13}}{6}}$ .

3. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\log_{3x} \frac{3}{x} + \log_3^2 x = 1$ .

Область определения:  $x > 0, x \neq \frac{1}{3}$

Перейдем к логарифмам по основанию 3:

$$\frac{1 - \log_3 x}{1 + \log_3 x} + \log_3^2 x = 1$$

$$(1 - \log_3 x)(1 - (1 + \log_3 x)^2) = 0$$

Приравняв каждый множитель к нулю, получим:

$$\log_3 x = 1, x_1 = 3$$

$$\log_3 x = 0, x_2 = 1$$

$$\log_3 x = -2, x_3 = \frac{1}{9}$$

Ответ:  $\frac{1}{9}; 1; 3$ .

4. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\log_a ax \log_x ax = \log_{a^2} \frac{1}{a}, a > 0, a \neq 1$ .

Область определения:  $x > 0, x \neq 1$

$$\log_a ax = 1 + \log_a x$$

$$\log_x ax = \log_x a + 1 = \frac{1}{\log_a x} + 1 = \frac{1 + \log_a x}{\log_a x}$$

$$\log_{a^2} \frac{1}{a} = \log_a a^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2}$$

$$(1 + \log_a x) \frac{1 + \log_a x}{\log_a x} = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{(1 + \log_a x)^2}{\log_a x} = -\frac{1}{2}$$

$$\log_a^2 x + \frac{5}{2} \log_a x + 1 = 0$$

Решив относительно  $\log_a x$  уравнение, получим

$$\log_a x = -\frac{1}{2}, x_1 = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

$$\log_a x = -2, x_2 = \frac{1}{a^2} \quad \text{.} \quad \text{Ответ: } \frac{1}{\sqrt{a}}; \frac{1}{a^2}.$$

5. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\log_4(x + 12) \log_x 2 = 1$ .

Область определения:  $x > 0, x \neq 1$

Приведем оба логарифма к основанию 2:

$$\log_4(x + 12) = \log_2 \sqrt{x + 12} = \frac{1}{2} \log_2(x + 12); \log_x 2 = \frac{1}{\log_2 x}$$

$$\frac{1}{2} \log_2(x + 12) \frac{1}{\log_2 x} = 1$$

$$\frac{1}{2} \log_2(x+12) = \log_2 x$$

$$\log_2(x+12) = \log_2 x^2$$

После потенцирования получим:  $x^2 - x - 12 = 0$ ;  $x_1 = 4, x_2 = -3$  (не входит в область определения)

Ответ: 4.

6. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\lg 10^{\lg(x^2+21)} - 1 = \lg x$ .

Область определения:  $\begin{cases} x^2 + 21 > 0 \\ x > 0 \end{cases} \Rightarrow x > 0$

Воспользуемся основным логарифмическим тождеством и получим:

$$\lg(x^2 + 21) - \lg 10 = \lg x$$

Используем свойство:  $\log_c \frac{a}{b} = \log_c a - \log_c b$

$$\lg \frac{x^2 + 21}{10} = \lg x, x^2 + 21 = 10x; x_1 = 3, x_2 = 7$$

Ответ: 3; 7.

7. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $6^{\log_6^2 x} + x^{\log_6 x} = 12$

Область определения:  $x > 0, x \neq 1$

Упростим первое слагаемое в левой части уравнения:

$$6^{\log_6^2 x} = (6^{\log_6 x})^{\log_6 x} = x^{\log_6 x}.$$

Подставим в данное уравнение и упростим:  $x^{\log_6 x} = 6$

Прологарифмируем по основанию 6:  $\log_6 x \log_6 x = 1, \log_6^2 x = 1$ .

$$\log_6 x = \pm 1, x_1 = 6; x_2 = \frac{1}{6}.$$

Ответ:  $\frac{1}{6}; 6$ .

8. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $4^{\log_{64}(x-3) + \log_2 5} = 50$ .

Область определения:  $x > 0$ .

Используем формулу:  $\log_b a = \log_b n a^n = \log_{n\sqrt[n]{b}} \sqrt[n]{a}$

$$4^{\log_4 \sqrt[3]{x-3} + \log_2 5} = 50, 4^{\log_4 \sqrt[3]{x-3}} 4^{\log_2 5} = 50.$$

Применим основное логарифмическое тождество:

$$\sqrt[3]{x-3} 2^{\log_2 25} = 50, 25 \sqrt[3]{x-3} = 50, \sqrt[3]{x-3} = 2, x = 11.$$

Ответ: 11.

9. РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ:  $\log_x 2 \log_{\frac{x}{16}} 2 = \log_{\frac{x}{64}} 2$ .

Область определения:  $x > 0, x \neq 1, x \neq 16, x \neq 64$ .

Перейдем к основанию 2:  $\frac{1}{\log_2 x} \frac{1}{\log_2 \frac{x}{16}} = \frac{1}{\log_2 \frac{x}{64}}$ .

$$\log_2^2 x - 5 \log_2 x + 6 = 0.$$

Введем замену:  $\log_2 x = y$ , тогда получим уравнение:

$$y^2 - 5y + 6 = 0, y_1 = 2; y_2 = 3.$$

$$\log_2 x = 2, x_1 = 4;$$

$$\log_2 x = 3, x_2 = 8.$$

Ответ: 4; 8.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Муравин, Г. К. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 11 класс [Текст] : учебник : рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации / Г.К. Муравин, О. В. Муравина. - 2-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2015. - 189 с. : ил. - Предм. указ.: с. 184-185. - Библиогр.: с. 186-189. - ISBN 978-5-358-14918-2 : 445-00.

2. Шарыгин, И. Ф. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. Базовый уровень. 10 - 11 классы [Текст] : учебник : рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации / И. Ф. Шарыгин. - 2-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2015 (Тверь : Тверской полиграф. комбинат дет. лит., 2015). - 238 с. : ил. - Предм. указ.: с. 233-234. - ISBN 278-5-358-15250-2: 393-00

3. Алпатов, А. В. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ А. В. Алпатов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 162 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/80328.html>.— ЭБС «IPRbooks»

4. Растопчина, О. М. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О. М. Растопчина — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский педагогический государственный университет, 2018.— 150 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79053.html>.— ЭБС «IPRbooks»

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение .....	3
1. Общие сведения о логарифмических уравнениях.....	4
2. Уравнения, решаемые по определению логарифма .....	5
3. Уравнения, решаемые потенцированием.....	7
4. Уравнения, сводящиеся к алгебраическим уравнениям .....	9
5. Уравнения, решаемые посредством логарифмирования .....	11
6. Уравнения, в которых используется модуль перехода и различные логарифмические тождества.....	12
Библиографический список.....	15



# **РЕШЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ**

## ***МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ***

*к выполнению самостоятельных работ  
по математике для студентов 1-го курса*

Составители:

Шахбазова Зоя Ивановна,  
Рыбина Светлана Леонидовна,  
Федотова Наталья Викторовна,  
Корчагин Игорь Иванович

Подписано к изданию 12.03.2020.

Уч.-изд. л. 0,8.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»  
394026 Воронеж, Московский просп., 14