ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический университет»

Кафедра высшей математики
и физико-математического моделирования

**ВАЖНЕЙШИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
В MAPLE**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для практических занятий по курсу «Математика»
для студентов направлений
16.03.01 «Техническая физика» 14.03.01, «Ядерная энергетика и
теплофизика» и 22.03.02 «Металлургия»
очной формы обучения

Воронеж 2021

Составители: канд. техн. наук С.А. Кострюков,
канд. техн. наук В.В. Пешков,
канд. физ.-мат. наук В.А. Шунина

Важнейшие математические операции в Maple: Методические указания для практических занятий по курсу «Математика» для студентов направлений 16.03.01 «Техническая физика» 14.03.01, 14.03.01 «Ядерная энергетика и теплофизика» и 22.03.02 «Металлургия» очной формы обучения / Воронеж. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет». 2021; сост. С.А. Кострюков, В.В. Пешков, В.А. Шунина. Воронеж, 20 с. Электронный ресурс кафедры высшей математики и физико-математического моделирования.

В методических указаниях кратко рассмотрены примеры выполнения простейших математических операций, необходимых студентам 1-го курса очной формы обучения с помощью широко распространенной универсальной системы компьютерной математики Maple.

Методические указания подготовлены в электронной форме и содержатся в файле ВМО в Maple.pdf.

Ответственный за выпуск зав. кафедрой д-р физ.-мат. наук,
проф. И.Л. Батаронов

Публикуется по решению методического семинара кафедры высшей математики и физико-математического моделирования.

Любая система компьютерной математики должна уметь выполнять базовые действия математического анализа, такие как дифференцирование, интегрирование, вычисление пределов, разложение функций в ряды и т.д. Конечно, такая мощная система, как Maple, здесь не является исключением и располагает многообразными и развитыми средствами по решению подобных задач. В большинстве случаев соответствующие Maple-функции находятся в ядре системы и не требуют подключения пакетов расширения.

1. Д и ф ф е р е н ц и р о в а н и е

Вычисление производной функции $f(x)$ может быть оформлено через Maple-функцию **diff**, первый аргумент которой есть заданная функция, а второй – переменная дифференцирования. Например, для нахождения производной функции $f(x) = x^2 \operatorname{arctg}(x-2)$ используется команда:

> **diff** ($x^2 \cdot \operatorname{arctan}(x-2)$, x);

$$2x \operatorname{arctan}(x-2) + \frac{x^2}{1+(x-2)^2}$$

Отметим, что для этой функции **diff**, как и для многих других функций Maple, существует так называемая инертная форма. Последняя отличается от основной формы только первой буквой – в инертной форме она заглавная, т.е. вызов осуществляется с помощью **Diff**. При этом непосредственного вычисления производной она не производит, но исходные данные выводит в математической нотации:

> **Diff** ($x^2 \cdot \operatorname{arctan}(x-2)$, x);

$$\frac{d}{dx} (x^2 \operatorname{arctan}(x-2))$$

Если справа от знака равенства записать функцию **diff**, а слева ту же самую функцию, но с большой буквы (т.е. в инертной форме), то получим вывод результата в весьма наглядном виде:

> **Diff(x^2*arctan(x-2), x)=diff(x^2*arctan(x-2), x);**

$$\frac{d}{dx}(x^2 \arctan(x-2)) = 2x \arctan(x-2) + \frac{x^2}{1+(x-2)^2}$$

Действительно, в строке вывода видим: производная заданной функции равна такой-то функции. Этот прием, улучшающий читабельность математических документов, довольно часто используется при вычислениях в Maple.

Следует сказать, что в пакете Maple существует особая функция **value**, с помощью которой в любой момент инертную функцию можно превратить в вычисляемую. Применительно к функции **Diff** такое действие приведет к вычислению производной:

> **r:=Diff(x^2*arctan(x-2), x): # r – вспомогательная переменная для хранения Diff**

> **value(r);**

$$2x \arctan(x-2) + \frac{x^2}{1+(x-2)^2}$$

Приведенный чуть выше способ вывода, когда слева стоит условие, а справа результат, можно получить, записав:

> **r=value(r);**

$$\frac{d}{dx}(x^2 \arctan(x-2)) = 2x \arctan(x-2) + \frac{x^2}{1+(x-2)^2}$$

Производную можно брать от вектор-функции. К примеру, вычисление производной от вектора, компонентами которого являются функции $\sin^2 x$, x^n , e^{ax} , можно оформить так:

> **Diff([sin(x)^2, x^n, exp(a*x)], x)=diff([sin(x)^2, x^n, exp(a*x)], x);**

$$\frac{d}{dx}[\sin(x)^2, x^n, e^{(ax)}] = \left[2 \sin(x) \cos(x), \frac{x^n n}{x}, a e^{(ax)} \right]$$

Производная порядка выше первого задается добавлением к имени переменной комбинации **\$m**, где **m** – число, равное

порядку. Найдем производную восьмого порядка функции $x^2 \ln(x-2)$:

> **Diff**($x^2 \ln(x-2)$, $x \S 8$)=**diff**($x^2 \ln(x-2)$, $x \S 8$);

$$\frac{d^8}{dx^8}(x^2 \ln(x-2)) = -\frac{6720}{(x-2)^6} + \frac{11520x}{(x-2)^7} - \frac{5040x^2}{(x-2)^8}$$

Можно попытаться упростить этот результат:

> **simplify**(");

$$\frac{d^8}{dx^8}(x^2 \ln(x-2)) = -\frac{240(x^2 - 16x + 112)}{(x-2)^8}$$

Функция **diff** также пригодна для вычисления частных производных. Частная производная по x функции двух переменных $f(x, y) = \cos(x/y + 1) x^2 y$:

> **diff**(**cos**($x/y+1$) * $x^2 * y$, x);

$$-\sin\left(\frac{x}{y} + 1\right) x^2 + 2 \cos\left(\frac{x}{y} + 1\right) x y$$

Частная производная по y той же функции (с использованием инертной формы):

> **Diff**(**cos**($x/y+1$) * $x^2 * y$, y)=**diff**(**cos**($x/y+1$) * $x^2 * y$, y);

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\cos\left(\frac{x}{y} + 1\right) x^2 y \right) = -\frac{\sin\left(\frac{x}{y} + 1\right) x^3}{y} + \cos\left(\frac{x}{y} + 1\right) x^2$$

Частная производная по y 2-го порядка:

> **Diff**(**cos**($x/y+1$) * $x^2 * y$, $y \S 2$)=**diff**(**cos**($x/y+1$) * $x^2 * y$, $y \S 2$);

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} \left(\cos\left(\frac{x}{y} + 1\right) x^2 y \right) = -\frac{\cos\left(\frac{x}{y} + 1\right) x^4}{y^3}$$

Смешанная частная производная:

> **Diff**(**cos**($x/y+1$) * $x^2 * y$, x, y)=**diff**(**cos**($x/y+1$) * $x^2 * y$, x, y);

$$\frac{\partial^2}{\partial y \partial x} \left(\cos\left(\frac{x}{y} + 1\right) x^2 y \right) = \frac{\cos\left(\frac{x}{y} + 1\right) x^3}{y^2} + \frac{2 \sin\left(\frac{x}{y} + 1\right) x^2}{y} + 2 \cos\left(\frac{x}{y} + 1\right) x$$

Для операций дифференцирования также может использоваться оператор **D**. Отметим, что здесь под термином «оператор» понимается специфический объект Maple, лишь в некото-

ром смысле напоминающий классический математический оператор. В форме $\mathbf{D}(\mathbf{f})(\mathbf{x})$ результат действия этого объекта аналогичен вызову $\mathbf{diff}(\mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{x})$. В записи $\mathbf{D}(\mathbf{f})$ он выдает производную функции $\mathbf{f}$ в символической форме или как отображение аргумент $\rightarrow$ значение функции. В частности,

$> \mathbf{D}(\cos^2 + \tan);$

$$-2 \sin \cos + 1 + \tan^2$$

$> \mathbf{D}(\sin @ \cos);$ # оператор $\mathbf{D}$ действует на композицию двух функций, т.е. на $\sin(\cos)$

$$-\cos^{(2)} \sin$$

(Здесь $\cos^{(2)}$ означает функцию $\cos(\cos \dots)$ – «косинус от косинуса»).

$> \mathbf{D}(\sin * \cos);$

$$\cos^2 - \sin^2$$

$> \mathbf{D}(\ln);$ # пример вывода в форме отображения

$$a \rightarrow \frac{1}{a}$$

Рассмотрим одно важное применение оператора $\mathbf{D}$. Зададим функцию $\sin x^2$:

$> \mathbf{f} := \mathbf{x} \rightarrow \sin(\mathbf{x}^2);$

Поставим целью определить функцию $\mathbf{u}(\mathbf{x})$, в каждой точке равную производной функции $\mathbf{f}$. Речь идет о Maple-функции, к которой потом можно было обращаться как к обычной математической функции, т.е. вычислять значение при заданном аргументе, строить графики, дифференцировать и т.д.? Такой, казалось бы, очевидный способ не приводит к успеху:

$> \mathbf{u} := \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{diff}(\mathbf{fun}(\mathbf{x}), \mathbf{x});$ # задание переменной $\mathbf{u}$ как функции $x \rightarrow f'(x)$

$$u := x \rightarrow \mathbf{diff}(\mathbf{fun}(x), x)$$

$> \mathbf{u}(2.);$ # попытка вычисления значения функции $\mathbf{u}(\mathbf{x})$ в точке $x=2$
Error, (in u) wrong number (or type) of parameters in function diff

Сообщение об ошибке. Это свидетельствует о том, что Maple не воспринимает $\mathbf{u}$ как функцию аргумента $\mathbf{x}$. Введение вспомогательной переменной $\mathbf{t}$ тоже не обеспечивает нужного результата:

```
>  $\mathbf{t} := \text{diff}(\text{fun}(\mathbf{x}), \mathbf{x}); \quad \mathbf{u} := \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{t};$   

 $t := 2 \cos(x^2) x$   

 $u := x \rightarrow t$ 
```

```
>  $\mathbf{u}(2.);$   

 $2 \cos(x^2) x$ 
```

В последнем выводе не происходит вычисления функции, значит, по-прежнему Maple не рассматривает $u(2)$ как значение функции $2\cos(x^2)x$ в точке $x=2$.

Проблема полностью решается с помощью оператора $\mathbf{D}$:

```
>  $\mathbf{D}(\mathbf{f});$  # производная функции  $f$  в виде отображения  $x \rightarrow f'(x)$   

 $x \rightarrow 2 \cos(x^2) x$ 
```

```
>  $\mathbf{u} := \mathbf{D}(\mathbf{f});$  # переменная  $\mathbf{u}$  для хранения этого отображения  

 $u := x \rightarrow 2 \cos(x^2) x$ 
```

```
>  $\mathbf{u}(2.);$  # значение функции  $f'(x)$  в точке  $x=2$   

-2.614574484
```

```
>  $\text{plot}(\{\mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{u}(\mathbf{x})\}, \mathbf{x}=0..5);$  # построение графиков функций  $f(x)$  и  $f'(x)$  при  $0 \leq x \leq 5$ .
```

Теперь видно, что $\mathbf{u}(\mathbf{x})$ как объект Maple, созданный для хранения производной, обладает всеми требуемыми свойствами, и может использоваться в дальнейших вычислениях наряду с другими объектами Maple.

Еще примеры на использование оператора $\mathbf{D}$:

```
>  $\mathbf{fun} := \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x} + 2 * \mathbf{x} * \exp(-\mathbf{x}^2);$  # задание функции одной переменной
```

```
>  $\mathbf{D}(\mathbf{D}(\mathbf{fun}));$  # производная от производной  

 $x \rightarrow -12 x e^{(-x^2)} + 8 x^3 e^{(-x^2)}$ 
```

```
>  $(\mathbf{D}@@5)(\mathbf{fun});$  # пятая производная
```

$$x \rightarrow 120 e^{(-x^2)} - 720 x^2 e^{(-x^2)} + 480 x^4 e^{(-x^2)} - 64 x^6 e^{(-x^2)}$$

> **D(fun)(2)** ; # производная в точке $x=2$

$$1 - 14 e^{(-4)}$$

> **evalf(")** ; # то же в форме числа с плавающей точкой

$$0.7435810555$$

> **D(fun)(2.)** ; # то же самое, что одновременно две последние команды

$$0.7435810558$$

> **g:=(x,y,z)->x*exp(y)+y*sqrt(z^1+1)** ; # задание функции трех переменных

$$g := (x, y, z) \rightarrow x e^y + y \sqrt{z+1}$$

> **D[2](g)** ; # частная производная по второй переменной, т.е. по y

$$(x, y, z) \rightarrow x e^y + \sqrt{z+1}$$

Для вычисления производных неявно заданных функций используется функция **implicitdiff**. Следующие примеры поясняют ее применение.

> **f:=y^(x)+ln(y)=1** ; # вводится неявная функция и присваивается переменной **f**

$$f := y^x + \ln(y) = 1$$

> **implicitdiff(f,y,x)** ; # производная функции $y(x)$ по x

$$-\frac{y^x y \ln(y)}{y^x x + 1}$$

> **implicitdiff(f,x,y)** ; # производная функции $x(y)$ по y

$$-\frac{y^x x + 1}{y^x \ln(y) y}$$

> **implicitdiff(f,y,x,x)** ; # вторая производная функции $y(x)$ по x

$$\frac{y^x y \ln(y) (-\ln(y) + 2 (y^x)^2 x + 2 y^x + (y^x)^2 x \ln(y) + y^x \ln(y))}{(y^x)^3 x^3 + 3 x^2 (y^x)^2 + 3 y^x x + 1}$$

2. Интегрирование

а) Неопределенные интегралы

Для вычисления неопределенных интегралов Maple предоставляет функцию **int**. При этом если аналитического значения интеграла не существует, возвращается исходная запись.

Пусть требуется вычислить интеграл $\int ax^n dx$. Имеем

```
> int(a*x^n, x);
```

$$\frac{ax^{(n+1)}}{n+1}$$

Существует инертная форма функции **int**:

```
> Int(ln(x)^3, x);
```

$$\int \ln(x)^3 dx$$

В таком представлении интеграл записывается, но не вычисляется, а если его все же требуется вычислить, то используется функция **value**:

```
> value(");
```

$$\ln(x)^3 x - 3 x \ln(x)^2 + 6 x \ln(x) - 6 x$$

Напомним, что символ " («кавычки») означает подстановку последнего вычисленного результата. Вместо него может стоять переменная, которой предварительно была присвоена инертная функция **Int**:

```
> t:=Int(ln(x)^3, x): value(t);
```

$$\ln(x)^3 x - 3 x \ln(x)^2 + 6 x \ln(x) - 6 x$$

Как и с функцией **diff**, весьма наглядный способ представления результата обеспечивается, когда в одной строке используется функция **int** вместе со своим аналогом в инертной форме **Int**. Этот способ вполне очевиден из примеров:

```
> Int(x^2*sin(x), x)=int(x^2*sin(x), x);
```

$$\int x^2 \sin(x) dx = -x^2 \cos(x) + 2 \cos(x) + 2 x \sin(x)$$

> **Int(sin(x)/x, x) = int(sin(x)/x, x); # эта функция называется интегральный синус**

$$\int \frac{\sin(x)}{x} dx = \text{Si}(x)$$

Следует помнить, что хотя в аналитических выражениях интегралов отсутствует аддитивная произвольная постоянная C , она должна там подразумеваться.

В некоторых случаях Maple не может взять интеграл, тогда с помощью функций **taylor** и **convert** можно попытаться представить результат в виде полинома умеренной степени, что демонстрирует следующий пример

> **w := int(exp(-sin(x)), x); # интеграл присваивается переменной w**

$$w := \int e^{(-\sin(x))} dx$$

> **convert(taylor(w, x=0, 8), polynom); # о параметрах функции taylor см. ниже**

$$x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{40}x^5 + \frac{1}{90}x^6 - \frac{1}{1680}x^7 - \frac{1}{720}x^8$$

Разумеется, что в этом случае решение является приближенным, но оно все же есть и с ним можно работать, например, строить график функции, представляющей данный интеграл.

- **convert/parfrac** – разложение рациональной функции на простые дроби

> **(x^5+1)/(x^4-x^2) = convert((x^5+1)/(x^4-x^2), parfrac, x);**

$$\frac{x^5 + 1}{x^4 - x^2} = x + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x^2}$$

б) Определенные интегралы

Для вычисления определенных интегралов используются те же функции **int** и **Int**, в которых надо указать пределы ин-

тегрирования, например $x=a..b$, если интегрируется функция переменной x .

> `Int(sin(x)/x, x=a..b)=int(sin(x)/x, x=a..b);`

$$\int_a^b \frac{\sin(x)}{x} dx = \text{Si}(b) - \text{Si}(a)$$

> `int(sin(x)/x, x=0..1);`

`Si(1)`

Maple предпочитает выводить результат в таком как бы незавершенном виде, так как считает его более точным значением, чем в виде числа с плавающей точкой. Однако если требуется именно численное значение интеграла, причем с любой заданной точностью, можно применить функцию **evalf**. Существует и другая возможность сразу получить численный результат, что показано в следующем примере:

> `int(sin(x)/x, x=0..1); # вместо целого числа 1 записано действительное 1.`

`0.9460830704`

(т.е. один или два предела интегрирования записываются в виде числа с плавающей точкой).

Еще примеры – несобственные интегралы:

> `Int(x*ln(x), x=0..1)=int(x*ln(x), x=0..1);`

$$\int_0^1 x \ln(x) dx = \frac{-1}{4}$$

> `Int(x*exp(-x), x=0..infinity)=int(x*exp(-x), x=0..infinity);`

$$\int_0^{\infty} x e^{-x} dx = 1$$

> `Int(1/(x^2+6*x+12), x=-infinity..infinity)=int(1/(x^2+6*x+12), x=-infinity..infinity);`

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + 6x + 12} dx = \frac{\pi\sqrt{3}}{3}$$

Последние два примера показывают, что пределами интегралов может выступать бесконечность, обозначаемая как **infinity**.

Возможна ситуация, когда определенный интеграл аналитически не вычисляется и не выражается даже в виде специальных функций, которые в очень большом количестве имеются в базе данных системы. Например,

```
> int(exp(-sin(x)), x=0..1);
```

$$\int_0^1 e^{(-\sin(x))} dx$$

В этом случае использование функции **evalf** позволяет посчитать интеграл численно (при этом задействуются именно численные методы интегрирования):

```
> evalf(");
```

0.6513249125

Другой пример:

```
> Int(exp(-x)/sqrt(x^2+1), x=0..exp(1))=
evalf(int(exp(-x)/sqrt(x^2+1), x=0..exp(1)));
```

$$\int_0^e \frac{e^{(-x)}}{\sqrt{x^2+1}} dx = 0.7366659769$$

Следует отметить, что если **evalf** применить к инертной функции **Int**, то это так же, как и в случае комбинации с **int**, вызовет численное вычисление интеграла, однако при этом есть возможность указать точность (разрядность сетки) и метод интегрирования. Например,

```
> evalf(Int((1-exp(-x^2))/x, x=0..100, 15, _NCrue));
4.89377801843886
```

в) Интегралы с переменными пределами интегрирования

Определим функцию $f(x) = \int_0^x e^{-t} \sin 2\pi t dt$, зависящую от

верхнего предела интеграла:

> **f:=x->int(exp(-t)*sin(2*Pi*t),t=0..x);**

$$f := x \rightarrow \int_0^x e^{(-t)} \sin(2 \pi t) dt$$

Теперь можно выполнять любые допустимые действия с этой функцией, например, вычислить её значение в конкретной точке:

> **f(2.);**

0.1342159345

или построить график

> **plot(f(x),x=0..4);**

г) Повторные интегралы

Повторные интегралы имеют вид

$$\int_a^b dx_n \int_{\varphi_1(x_n)}^{\varphi_2(x_n)} \dots \int_{\psi_1(x_2, \dots, x_n)}^{\psi_2(x_2, \dots, x_n)} dx_1.$$

Вычисление этих интегралов сводится к рекурсивному вызову функции **int** (либо **Int**). Например, если интегрируется функция двух переменных, можно использовать команды

> **Int(Int(arctan(y/x)/(x*y),x=2.0..4.4),y=-2..3.0);**

$$\int_{-2}^{3.0} \int_{2.0}^{4.4} \frac{\arctan\left(\frac{y}{x}\right)}{x y} dx dy$$

> **evalf("");**

1.257050378

Обратите внимание в приведенном примере на форму записи интеграла, которую легко принять за двойной интеграл. Тем не

менее, это интеграл повторный, причем сначала интегрирование производится по x , а затем по y .

Повторный интеграл от функции трех переменных:

```
> int(int(int((x^2+y^2)*z, z=0..a), y=0..a), x=0..a);
```

$$\frac{a^6}{3}$$

Пример повторного интеграла, у которого внутренний интеграл имеет переменные пределы:

```
> p:=Int(Int(2-x-y, x=sqrt(y)..y^2), y=0..1): p=value(p);
```

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^{y^2} 2-x-y \, dx \, dy = \frac{-11}{30}$$

Как известно, вычисление кратных интегралов сводится к повторным интегралам.

3. Вычисление пределов функций

Для вычисления предела функции в точке $x=a$ в пакете Maple используются функции

```
limit(f, x=a);           limit(f, x=a, dir);
Limit(f, x=a);         Limit(f, x=a, dir);
```

Здесь f – алгебраическое выражение, x – имя переменной, dir – параметр, указывающий направление поиска предела (**right** – справа, **left** – слева, **real** – в области вещественных значений, **complex** – в области комплексных значений). Значением a может быть бесконечность.

Внимательно разберите примеры.

```
> Limit(sin(x)/x, x=0)=limit(sin(x)/x, x=0); # первый
замечательный предел
```

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

```
> Limit((x-2)/x)^x, x=infinity)=limit(((x-2)/x)^x,
x=infinity);
```

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{x} \right)^x = e^{(-2)}$$

> **Limit**(2^(1/x), x=0, left)=limit(2^(1/x), x=0, left);
 # левосторонний предел

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} 2^{\left(\frac{1}{x}\right)} = 0$$

> **Limit**(2^(1/x), x=0, right)=limit(2^(1/x), x=0, right);
 # правосторонний предел

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{\left(\frac{1}{x}\right)} = \infty$$

> **Limit**((x-2)/(1+x))^x, x=-infinity)=
 limit((x-2)/(1+x))^x, x=-infinity);

$$\lim_{x \rightarrow (-\infty)} \left(\frac{-2+x}{x+1} \right)^x = e^{(-3)}$$

> **Limit**((2^x-1)/x, x=0)=limit((2^x-1)/x, x=0);

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} = \ln(2)$$

4. Разложение функций в ряды

Для разложения функции или выражения в ряд служат Maple-функции

series(expr, eqn); **taylor**(expr, eqn);
series(expr, eqn, n); **taylor**(expr, eqn, n);

Функции **series** осуществляют разложение в степенной ряд, функции **taylor** – в ряд Тейлора. Здесь **expr** – разлагаемое в ряд выражение, **eqn** – имя переменной (например, **x**) или равенство в виде **x=a**, **n** – целое положительное число, определяющее порядок разложения (при отсутствии **n** полагается равным 6). При задании **eqn** в виде **x=a** разложение ищется

относительно точки $x = a$. Если вместо $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ указано просто $\mathbf{x}$, разложение осуществляется в окрестности точки $x = 0$.

Разложение получается в форме степенного многочлена, порядок которого определяется параметром $\mathbf{n}$ (на единицу меньше). Остаточная погрешность задается членом вида $O(\mathbf{x} - \mathbf{a})^{\mathbf{n}}$. При точном разложении этот член отсутствует. В общем случае для его удаления можно использовать функцию **convert**.

> **series(sinh(x), x=0)**; # разложение в ряд по степеням x гиперболического синуса

$$x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + O(x^6)$$

> **series(sinh(x), x=1, 3)**; # первые три члена разложения $\operatorname{sh} x$ по степеням $x-1$

$$\left(\frac{1}{2}e - \frac{1}{2}\frac{1}{e}\right) + \left(\frac{1}{2}e + \frac{1}{2}\frac{1}{e}\right)(x-1) + \left(\frac{1}{4}e - \frac{1}{4}\frac{1}{e}\right)(x-1)^2 + O((x-1)^3)$$

> **series(sinh(x), x=1., 3)**; # то же самое, но коэффициенты в виде десятичных дробей

$$1.175201193 + 1.543080635(x-1.) + 0.5876005967(x-1.)^2 + O((x-1.)^3)$$

> **series(sin(x)/x, x, 10)**; # члены разложения в ряд функции $\sin x/x$ по степеням $0, 1, \dots, 9$

переменной x

$$1 - \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{120}x^4 - \frac{1}{5040}x^6 + \frac{1}{362880}x^8 + O(x^9)$$

> **convert(", polynom)**; # отбрасывается остаточный член

$$1 - \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{120}x^4 - \frac{1}{5040}x^6 + \frac{1}{362880}x^8$$

> **2/sqrt(Pi) * Int(exp(-t^2), t=0..x) =**

2/sqrt(Pi) * int(exp(-t^2), t=0..x); # это так называемая функция ошибок

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt = \operatorname{erf}(x)$$

> **s:=taylor(erf(x), x, 9)**; # разложение этой функции в ряд Маклорена

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}}x - \frac{2}{3\sqrt{\pi}}x^3 + \frac{1}{5\sqrt{\pi}}x^5 - \frac{1}{21\sqrt{\pi}}x^7 + O(x^9)$$

> **evalf(convert(s, polynom), 5);** # то же разложение в числовом формате

$$1.1283x - 0.37612x^3 + 0.11283x^5 - 0.026865x^7$$

Есть в пакете Maple и другие встроенные функции, позволяющие получить разложения в ряд математической функции. Например,

asympt – асимптотическое разложение,

5. Вычисление сумм и произведений

Для вычисления сумм и произведений последовательностей могут использоваться функции:

sum(f, k);	product(f, k);
sum(f, k=m..n);	product(f, k=m..n);
sum(f, k=alpha);	product(f, k=alpha);

Здесь **f** – функция, задающая члены суммируемого ряда, **k** – индекс суммирования, **m** и **n** – целочисленные пределы изменения **k**, **alpha** – выражение формата **RootOf**. Значение **n** может быть равно бесконечности (**infinity**).

> **sum(k^2, k=0..4);**

30

> **Sum(k^2, k=0..4)=sum(k^2, k=0..4);**

$$\sum_{k=0}^4 k^2 = 30$$

Разработчики Maple рекомендуют при использовании упомянутых функций заключать **k** и **f** в прямые кавычки, например **sum('f', 'k'=m..n)**. Это предотвратит возможную ошибку, связанную с предшествующим присваиванием переменной **k** определенного значения.

> **sum('k^2', 'k'=0..n);**

$$\frac{1}{3}(n+1)^3 - \frac{1}{2}(n+1)^2 + \frac{1}{6}n + \frac{1}{6}$$

> sum('a[k]*x^k', 'k'=0..4);
 $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4$

> sum('1/k!', 'k'=0..infinity);
 e

> r:=Sum(Sum(k^2, k=1..m), m=1..N):
 r=factor(simplify(value(r)));

$$\sum_{m=1}^N \left(\sum_{k=1}^m k^2 \right) = \frac{N(N+2)(N+1)^2}{12}$$

Обратите внимание на следующий пример, в котором второй аргумент функции sum задан просто как 'k':

> t:=sum('-exp(-k)', 'k');
 $t := \frac{e}{(-1+e)e^k}$

В справочной системе Maple такой вид суммы именуется как indefinite sum («неопределенная сумма»). Если этот результат обозначить как $t(k)$, то выполняются свойства

$$t(k+1) - t(k) = f(k), \quad t(n+1) - t(m) = \sum_{k=m}^n f(k),$$

где $f(k)$ – суммируемая последовательность – первый аргумент функции sum. Проверим последнее свойство.

> subs(k=n+1, t) - subs(k=1, t);
 $\frac{e}{(-1+e)e^{(n+1)}} - \frac{1}{-1+e}$

> sum('-exp(-k)', 'k'=1..n);
 $\frac{e}{(-1+e)e^{(n+1)}} - \frac{1}{-1+e}$

По смыслу indefinite sum во многом напоминает частичную сумму S_{n+1} ряда с общим членом $f(k)$ (продумайте этот вопрос). Произведения членов последовательности строятся аналогично:

> product(k^2, k=1..4);
 576
 > Product(n+k, k=0..m) = product(n+k, k=0..m);

$$\prod_{k=0}^m (n+k) = \frac{\Gamma(n+m+1)}{\Gamma(n)}$$

> product(k, k=RootOf(x^3-2));
2

Задания для самостоятельной работы

Вариант 1

1. Найти производные:

а) y' , если $y = \ln(\cos(x^2 + 1))$;

б) y^{IV} , если $y = x \ln(1-3x)$;

в) y'_x и y''_x для параметрически заданной функции:

$$x(t) = \operatorname{arctg} t, \quad y(t) = \ln(1+t^2);$$

г) y'_x и y''_x для неявно заданной функции $xy = \operatorname{arctg} \frac{x}{y}$;

2. Вычислить интегралы

а) $\int \frac{\sqrt{x^2+4}}{x} dx$;

б) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+2)^2(x^2+10)^2}$;

в) $\int_0^{2\pi} \frac{dt}{(\sqrt{7} + \cos t)^2}$;

г) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^3 dr$;

3. Найти суммы рядов: а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$; б) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+3}}{(n+1)(n+2)}$;

4. Вычислить пределы:

а) $\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x+1})^{\pi/\operatorname{arctg} x}$; б) $\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\ln(1-x) + \operatorname{tg}(\pi x/2)}{\operatorname{ctg} \pi x}$;

5. Построить графики функций:

а) $\int_0^t \frac{\sin x}{x} dx$; б) $\int_0^t \cos \frac{\pi x^2}{2} dx$.

Вариант 2

1. Найти производные

а) $f'(x)$, если $f(x) = x\sqrt{64-x^2} + 64\arcsin\left(\frac{x}{8}\right)$;

б) $f^{(10)}(x)$, если $f(x) = \frac{x^2+1}{x+1}$;

в) $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$ для функции, заданной параметрически:

$$x(t) = \sin^2 t, \quad y(t) = \ln \cos t;$$

г) $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$ для функции, заданной неявно уравнением

$$xy - \sqrt[3]{xy^2} + 6 = 0.$$

2. Вычислить интегралы

а) $\int \frac{\sin x - \cos x}{\sin^2 x} e^x dx$; б) $\int_0^{\pi/2} \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x dx$;

в) $\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 3x}{\sqrt[3]{2+x^4}} dx$; г) $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{1-x} (x^2 + y) dy$.

3. Найти суммы рядов

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2 + 3n + 1}{n^3(n+1)^3}$; б) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$

4. Вычислить пределы

а) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 e^{2x} + \ln(1-x^2)}{x \cos x - \sin x}$; б) $\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{d}{dx} \ln(1 + \sqrt[5]{x^7})$.

5. Найти значения функции $F(x)$ при $x=0.2$, $x=0.5$ и $x=1$ и построить её график, если

$$F(x) = -\int_0^x \ln \cos t dt, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}.$$